

Approccio ortodontico protesico alle malocclusioni con perdite di dimensione verticale

F. FACCIONI, P. FILIPPINI, A. FANTI
e R. CORTELAZZI

*Ospedale Policlinico, Clinica Odontoiatrica
Università di Verona*

SOMMARIO

Frequentemente la perdita di elementi dentali nei settori posteriori, oltre a determinare una malposizione degli elementi prossimali ed antagonisti, provoca una riduzione della dimensione verticale. In tali casi pertanto è necessario un approccio ortodontico pre-protesico con l'utilizzo di una meccanica complessa che non si limiti alla preparazione di idonei pilastri protesici, ma consideri anche la necessità del ripristino di una corretta dimensione verticale e di ottimali guide in protrusione e lateralità.

Spesso una siffatta situazione oclusale determina una patologia articolare che rappresenta uno dei principali obiettivi terapeutici.

Gli Autori presentano a scopo esplicativo un caso di III Classe dentale con edentulismo parziale e perdita di dimensione verticale trattato mediante una combinazione di terapia ortodontica - protesica.

INTRODUZIONE

E' frequente nell'adulto l'osservazione clinica di malocclusioni complicate da perdita di elementi dentali per carie o problemi parodontali.

Una riabilitazione orale corretta è possibile solo con una terapia interdisciplinare ortodontica - protesica preceduta naturalmente da tutta la preparazione parodontale e conservativa.

Il sistema stomatognatico infatti va considerato come qualcosa di unitario e non come un insieme di fattori anatomici e funzionali tra loro indipendenti.

XXIII Congresso
Nazionale
della Società Italiana
di Odontostomatologia
e Chirurgia
Maxillo-Facciale

Bologna
30 novembre
3 dicembre 1992